



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.2251
YAYIN TARİHİ	15.06.2015
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1/4

OMUZ ARTROPLASTİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

TANI:

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem hakkında bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Bilgilendirme sonucunda tamamen serbest iradenizle işlemi yaptıрма veya reddetme hakkına sahipsiniz. Anestezi doktorunuzdan da anestezi ile ilgili bilgi alınız ve anestezi onam formunu doldurunuz.

Yöntem:

Hasta eklemcın cerrahi olarak çıkarılarak, kol kemiğı (humerus) ile kürek kemiğıne (skapula) takılacak metal bir eklemcın yerleştirilmesidir. Bu metal implantların arasına polyethilen malzemeden üretilen bir aparat yerleştirilir. Omuza konulan metal protez olarak bilinir. Çoğu durumda kol ve kürek kemiklerine protezi sabitlemekte kemik çimentosu kullanılır.

Önerilen tedavinin alternatifleri:

Cerrahi olarak protez haricinde kemiğın üstünden konulan plak ile kırık tepiti yapılabilir. Cerrahi dışı alçı ve bandaj tedavisi uygulamaları tercih edilebilir.

Tedavi olmazsanız:

Kolun üst kısmındaki kırıkların kaynaması zor olan kırıklardır tedavi olmazsanız kırık kaynamaması veya yanlış kaynamasına bağılı omuz eklemcinde artroz (kireçlenme) gibi durumlar gelişebilir. Hastalık ilerledikçe uygulanacak tedaviler daha karmaşık hale gelir ve başarı şansları düşebilir. Ancak kırık iyileşmesinin hangi kriterlere göre ve ne hızda ilerlediğı, kırık tipine ve hastaya göre değişebilmektedir. Kolun üst kısmındaki kırıklarda omuza yakın parçanın dolaşımının bozulması sık görülen bir durumdur ve dolaşım bozulması sonucu omuz eklemcine yakın olan parçanın nekrozuna (çürümesine) bağılı ileride nekroze parçanın çıkarılarak protez yapılması gerekebilir. Kırığın yanlış kaynamasına bağılı gelişebilecek olan omuz eklemcinde hareket kısıtlılığı veya artroza (kireçlenme) bağılı omuzda ağrı şikayetleri gelişebilir.

Önerilen tedavinin başarı oranı:

Amaç sizi ağrıdan kurtarmaktır. Hareketli bir eklem elde etmektir. Başarı şansı %60 ile %90 arasındadır.

Ameliyatın Riskleri

Cerrahi işlem sırasında cerrahi bölgedeki kas ve sinirlerin yaralanmasına sonucunda uyuşukluk ve kuvvet kayıpları olabilir. Bu durum kalıcı ya da geçici olabilir. Cerrahi bölgedeki ciltte hasarlar, cilt ölümleri (nekroz) gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar ve deri greftlemesi (nakli) gerektirebilir.

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.2251
		YAYIN TARİHİ	15.06.2015
		REVİZYON NO	00
	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	2/4

Genel riskler ve komplikasyonlar

- a)Anestezi riski : Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında riskler vardır. Ayrıca anestezinin her şeklinde ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır. Spinal anestezide beyin ve omuriliği etkileyerek menenjit oluşmasına dahi sebebiyet verebilen enfeksiyonlar olabilir.
- b)Akciğerin bir bölümü sönebilir (kollaps) ve buna bağlı olarak da akciğer-göğüs enfeksiyonu gelişmesi söz konusu olabilir. Bunlara bağlı antibiyotik ve diğer ileri tedavi işlemleri gerekebilir.
- c)Ağrı ve şişmeyle seyreden bacak damarları içinde kanın pıhtılaşması (Derin ven trombozu) olabilir. Küçük bir ihtimal de olsa oluşan bu pıhtının bir kısmı kopup bir başka organa hasar vermesi mümkündür. Özellikle akciğer tıkanmasına yol açan pıhtılar ölümcül seyredebilmektedir.
- d)Kalbin zorlanmasına bağlı kalp krizi ve inme gelişmesi.
- e)Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda bu alerjik reaksiyon çok hızlı ve ölümcül (anafilaksi) şeklinde ortaya çıkabilir.
- f) Cerrahi sonrasında ağrı yakınmasında artma olabilir. Bazen geçmeyen ağrı görülebilir.
- g)Kanama riski: Olağan olmasa da ameliyat esnasında veya sonrasında kanama mümkündür. Kanamanın kaynağı veya miktarına göre ek tedaviler ve kan transfüzyonu gerekebilir
- h)Cerrahiden faydalanmama : Yapılacak cerrahi girişim yakınmaların tamamının veya bazılarının düzelmesini sağlamayabilir.
- i)Enfeksiyon : Yara yerinde veya derin dokularda enfeksiyon olabilir. En çok korkulan durumlardandır. Protezi değiştirmek ile amputasyon (kolun kesilmesi) arasındaki her durumla sonuçlanabilir. Vücudunuzun herhangi bir yerindeki enfeksiyon bu bölgeye ilerleyebilir. Bu yüzden özellikle diş, boğaz ve idrar yolu enfeksiyonlarınızda mutlaka doktora başvurunuz.**
- i)Sinir yaralanması : Nadir de olsa cerrahi sırasında veya sonrasında beklenmedik şekilde oluşabilir. Bu durum kol ve/veya bacak güçsüzlüğüne, sebebiyet verebilir.
- j)Tekrarlama : Cerrahi sonrasında erken veya geç dönemde yakınmaların bazıları tekrar görülebilir ve bu durumda da ek cerrahi girişim gerekebilir.
- k) Bazı hastalarda, yara iyileşmesi anormal olabilir ve iyileşme dokusu (scar- nedbe) kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir.
- l) Şişman (obez) hastalarda yara yeri enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer komplikasyonu ve tromboz (toplar ve atar damarlarda pıhtı oluşması) komplikasyon ihtimali daha fazladır.
- m) Sigara içen hastalarda yara yeri enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer komplikasyonu ve tromboz (atar ve topolar damrlarda pıhtı oluşması) komplikasyon ihtimali daha fazladır.
- n) Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu ve renk değişiklikleri

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.2251
		YAYIN TARİHİ	15.06.2015
		REVİZYON NO	00
	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	3/4

o) Hiçbir eklem protezi insanın doğal eklemi gibi sonuçlanamayacağından dolayı, protez çıkıkları meydana gelebilir ve ikinci cerrahiler gerekli olabilir.

ö) Protezin altından veya üstünde kemik kırığı oluşabilir. Bu ameliyat sırasında veya ameliyattan sonraki dönemlerde görülebilir.

p)Ameliyat esnasında ölüm riski dahi vardır. Bu tüm ameliyatlarda olabilecek bir risktir.

Özel Durumlar :

Allerjilerim (Varsa lütfen yazınız):

Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına neden olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

Dokunun kullanımı : Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta kimliğinin saklandığı sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. Cerrahi işlem sırasında çıkarılmış olabilen herhangi bir doku, tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının kullanımına onam veriyorum.

Tıbbi araştırma : Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; kurumumdaki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliği korunduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.

Fotoğraf/İzleyiciler : Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat sırasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum.

Onam Doğrulama:

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.2251
		YAYIN TARİHİ	15.06.2015
		REVİZYON NO	00
	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	4/4

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle tedavi olmaya karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Okudum anladım, onay veriyorum.

..... Tarih: .../.../20... Saat:.....

Cerrahi Alan:

X Sağ X Sol X Bilateral

Sigara Kullanımı:

X Yok X Bırakalı Ne Kadar Oldu

X Var X Kaç yıldır: X Günde Kaç Paket:

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Tarih: .../.../20... Saat:.....

İmza : _____

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim