



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE SEZARYEN SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ
(VTE) PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

DOKÜMAN KODU	GKG.FR.49
YAYIN TARİHİ	06.08.2020
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1 / 1

Gösterge Kodu	Gİ.GKG49																		
Gösterge Tanımı	İlgili dönemde, sezaryen ile doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade eder.																		
Amaç	Sezaryen ile doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilmesi ve olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılması amaçlanmaktadır.																		
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde sezaryen sonrası VTE profilaksisi uygulanan hasta sayısı/VTE yönünden riskli olan ve sezaryen yapılan toplam hasta sayısı) x 100																		
Alt Göstergeler	Hekim bazında sezaryen sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı																		
Veri Kaynağı	HBYS																		
Hedef Değer	<%45																		
Veri Analiz Periyodu	3 aylık																		
Sorumlular	Doğum Salonu Kalite Birim sorumlusu																		
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Hastane Yönetimi,Kalite Birim sorumluları																		
Dikkat Edilecek Hususlar	Sezaryan operasyonu sonrası DMAH (Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin) başlama kriterleri (postpartum 10 gün DMAH başlanır): - Acil sezaryen yapılanlar ve morbid obez hastalar (> 40 kg/m²) - Elektif sezaryen yapılan hastalarda ise aşağıdaki parametrelerden birinin varlığı: <table><tr><td>Maternal obezite (> 30kg/m²)</td><td>Preterm doğum</td></tr><tr><td>Çoğul gebelik</td><td>Akrabada VTE öyküsü</td></tr><tr><td>IVF gebeliği</td><td>Maternal düşük riskli VTE</td></tr><tr><td>Preeklamsi</td><td>Anne yaşının > 35 olması</td></tr><tr><td>Ölü fetus</td><td>Sistemik enfeksiyon</td></tr><tr><td>Postpartum kanama</td><td>İmmobilizasyon</td></tr><tr><td>Variköz venler,</td><td>Yüksek riskli trombofili riski</td></tr><tr><td>Parite > 3</td><td>Ailede geçirilmiş VTE</td></tr><tr><td>Sigara içilmesi</td><td>Geçirilmiş VTE</td></tr></table> Medikal hastalık (kanser, kalp yetmezliği, aktif SLE, aktif inflamatuvar barsak hast ve aktif inflamatuvar poliyartropati gibi inflamatuvar hastalıklar, nefrotik sendrom, nefropatili Tip 1 DM, orak hücre hastalığı, mevcut intravenöz ilaç bağımlılığı) Bkz: Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi	Maternal obezite (> 30kg/m ²)	Preterm doğum	Çoğul gebelik	Akrabada VTE öyküsü	IVF gebeliği	Maternal düşük riskli VTE	Preeklamsi	Anne yaşının > 35 olması	Ölü fetus	Sistemik enfeksiyon	Postpartum kanama	İmmobilizasyon	Variköz venler,	Yüksek riskli trombofili riski	Parite > 3	Ailede geçirilmiş VTE	Sigara içilmesi	Geçirilmiş VTE
Maternal obezite (> 30kg/m ²)	Preterm doğum																		
Çoğul gebelik	Akrabada VTE öyküsü																		
IVF gebeliği	Maternal düşük riskli VTE																		
Preeklamsi	Anne yaşının > 35 olması																		
Ölü fetus	Sistemik enfeksiyon																		
Postpartum kanama	İmmobilizasyon																		
Variköz venler,	Yüksek riskli trombofili riski																		
Parite > 3	Ailede geçirilmiş VTE																		
Sigara içilmesi	Geçirilmiş VTE																		