

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Gİ.GKG.50
		YAYIN TARİHİ	06.08.2020
		REVİZYON NO	00
	RİSK DÜZEYİNE GÖRE VAJİNAL DOĞUM SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Gösterge Kodu	Gİ.GKG50
Gösterge Tanımı	İlgili dönemde, vajinal doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade eder.
Amaç	Vajinal doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilerek,olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılması amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanan hasta sayısı/VTE yönünden riskli olan ve vajinal doğum yapan toplam hasta sayısı) x 100
Alt Göstergeler	Hekim bazında vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı
Veri Kaynağı	HBYS
Hedef Değer	<% 35
Veri Analiz Periyodu	3 aylık
Sorumlular	Doğum Salonu Kalite Birim sorumlusu
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Hastane Yönetimi,Kalite Birim sorumluları
Dikkat Edilecek Hususlar	VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ: - Antenatal dönemde toplam puan ≥ 4 ise 1.trimesterden itibaren tromboprofilaksi önerilir. - Antenatal dönemde toplam puan 3 ise 28. gebelik haftasından itibaren tromboprofilaksi önerilir. - Postnatal dönemde toplam puan ≥ 2 en az 10 gün süreyle tromboprofilaksi önerilir. - Antenatal dönemde hastaneye yatış durumunda tromboprofilaksi önerilir. - Puerperium döneminde hastanede uzun yatış (≥ 3 gün) veya tekrar hastaneye yatış durumunda tromboprofilaksi önerilir. Venöz Tromboemboli (VTE) için Risk Faktörleri Puanlaması için Bkz: Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi