

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	HB.TL.02
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Hastaya hekimin order ettiği tedaviyi doğru şekilde uygulamak.

2. **KAPSAM:** Hekimin tedavisini planladığı hastalar.

3. **FAALİYET AKIŞI:**

- Eller yıkanır.
- İlaç hazırlanır.
- Hazırlanan ilaç tedavi tepsisine koyulur, hasta yanına gidilir.
- Hastanın kimliği kontrol edilir.
- Hastaya yapılacak işlem hakkında açıklamada bulunulur.
- Uygun enjeksiyon bölgesi seçilir.
- Hastanın genel durumuna uygun pozisyon verilir.
- Dorsagluteal ve ventrogluteal bölgeye; prone, letaral, sims
- Laterofemoral bölgeye; supine veya fawler
- Deltoid bölgeye; supine veya fawler pozisyonu verilir.
- Enjeksiyon bölgesi tanılanır.
- İşlem sırasında hasta mahremiyeti korunur.
- Belirlenen enjeksiyon bölgesi antiseptik solüsyonlu pamuk ile içten dışa doğru friksiyoner hareketle, bir defada temizlenir.
- İğnenin steril başlığı çıkarılır.
- Daha az kullanılan elin yardımıyla deri ve deri altı tabakası bastırılarak gerilir. Hastaya gevşemesi ve dikkatini başka yöne çekmek için derin bir nefes alması söylenir.
- Enjektör kullanılan elin baş ve işaret parmağı arasında tutulur. İğnenin açık ucu üstten görülebilecek şekilde, 90 derecelik açıyla ve hızla dokuya batırılır.
- İğne doku içindeyken enjektör kıpırdatmadan sabit tutulur.
- Enjektörü tutan el sabit kalarak, deri ve derialtı tabakalarını gerdiğiniz el serbest kalarak enjektörün pistonu geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir.
- Eğer kan gelirse iğne geriye çekilir ve enjektör ile ilaç yeniden değiştirilir. Başka bir bölge seçilir.
- Kan gelmediyse piston yavaşça itilerek, dokuda basınç oluşturmayacak hızla ilaç kasa verilir.
- Steril kuru pamukla basınç oluşturarak iğne giriş açısı ve hızı ile çıkartılır.
- Enjeksiyon alanına kanama durana kadar hafifçe masaj uygulanır.
- Hastanın rahat pozisyon alması sağlanır. Malzemeler temizlenerek kaldırılır, eller yıkanır. Atıklar talimata uygun olarak elimine edilir.
- Hemşire Gözlem Kağıdına işlem kayıt edilir. Hasta işlemden sonraki ilk 15- 30 dk. içinde gözlenir