



T.C.  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
ÇOCUK GASTROENTOROLOJİ BİLİM DALI

|                 |            |
|-----------------|------------|
| DOKÜMAN KODU    | GN.FR.1647 |
| YAYIN TARİHİ    | 07.11.2013 |
| REVİZYON NO     | 00         |
| REVİZYON TARİHİ | --         |
| SAYFA NO        | 1/2        |

## KARACİĞER BİYOPSİ İŞLEMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

.....

### KARACİĞER BİYOPSİ İŞLEMİ

Karaciğer biyopsisi, özel bir iğne kullanarak karaciğerden parça alınması işlemidir. Karaciğer hastalığı ya da başka bir hastalığın karaciğerde oluşturduğu hasarı görebilmek için biyopsi ile alınan karaciğer parçasının mikroskop altında incelenmesine ve dolayısıyla hastalığın tedavisine olanak sağladığı için yapılır.

Bu işlem hepatit, siroz, portal hipertansiyon, karaciğer safra yolu hastalıkları, karaciğerde anormalde madde birikimi yapan hastalıklar, açıklanmayan karaciğer büyümesi ve karaciğer enzim yüksekliği olan çocuklarda yapılmaktadır. Bu işlem hastanede yatırılarak yapılmaktadır. İşlem öncesi hastanın yaşına göre 4-8 saat herhangi bir şey yememeli ve su dahi içmemelidir. Biyopsi öncesinde çocuğunuza takılan serumdan işlem sırasında hi. Bir acı ve ağrı duymaması ve uyum sağlamsı için sakinleştirici ilaçlar veya anestetiksel verilecektir. Bu şekilde çocuğunuz hiçbir rahatsızlık duymadığı gibi, sonrasında yapılan işlem boyunca da çocuğunuzun solunum ve kalp atışları takip edilecektir. Biyopsi alınacak bölge lokal ağrı kesicilerle uyuşturulduktan sonra, 2-3 mm uzunluğundaki bir kesiden özel karaciğer biyopsi iğnesi ile yaklaşık 1-2 cm uzunluğunda 1,5 mm kalınlığında parça alınacaktır.

### İŞLEMİN RİSKLERİ

Her girişimde olduğu gibi karaciğer biyopsilerinde de bazı komplikasyonlar olabilir. Tüm dünyada komplikasyon gelişme riski 1.000’de 3 ile 10.000 ‘de 6’dır. En çok görülen komplikasyon kanamadır. Ve genellikle işlemden sonra ilk 4-6 saat içinde olmaktadır. Bu nedenle ilk 4-6 saat hasta yakın takip edilecektir. Bu kanamalar çoğunlukla kendiliğinden durur., ancak bazen acil ameliyat gerekebilir, hatta ölüme neden olabilir.

Diğer komplikasyonlar : Atardamar ile toplardamar arasında köprü oluşması safra yollarının veya safra kesesinin delinmesi ve buna bağlı karın zarı iltihabı iğnenin akciğer, böbrek ve kalın bağırsak gibi diğer organlara geçmesidir.

### İŞLEM SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Karaciğer biyopsisi düşük olasılıkla da kanamaya yol açabileceği için işlem öncesi hastanın kan değerlerinin normal olup olmadığı kontrol edilecek, kanama ihtimaline karşı 1 ünite uygun kan grubundan kan hazırlanacak ve işlem sonrası da en az 6 saat tansiyon, kalp atım sayısı, solunumu, kan değerleri yakından takip edilecektir.

Hasta, biyopsiden sonra en az 12 saat yataktan kalkmamalı, tüm ihtiyaçlarını yatakta gidermelidir. Biyopsiden sonra bir hafta atlama, zıplama gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.

|                                                                                   |                                                                                  |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | T.C.<br>NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ<br>MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ          | DOKÜMAN KODU    | GN.FR.1647 |
|                                                                                   |                                                                                  | YAYIN TARİHİ    | 07.11.2013 |
|                                                                                   |                                                                                  | REVİZYON NO     | 00         |
|                                                                                   | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI<br>ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI | REVİZYON TARİHİ | --         |
|                                                                                   |                                                                                  | SAYFA NO        | 2/2        |

İşlem sonrası genellikle ağrı olmamakta beraber ,bazen karının sağ üst kısımda ,omuza vuran ağrı olabilir.

B u işlemi yaptırmak istememiz hastanemizde bakım görmenizi etkileyemeyecektir.

Çocuğunuza yapılacak karaciğer biyopsisi ile ilgili ek sorularınız olursa işlem öncesinde ya da işlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar için çalışma saatleri içinde .....ve çalışma saatleri dışında .....numaralı telefonlar ile iletişim kurunuz .

İşlemi yaptırmadan önce bu metni okumanızı ve herhangi bir sorunuz varsa yanıtladıktan sonra işlem için onay vermenizi istiyoruz .

### Onam Doğrulama :

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : \_\_\_\_\_

İmzası: \_\_\_\_\_

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : \_\_\_\_\_

Çalıştığı Kurum:

İmza : \_\_\_\_\_

|            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN     | ONAYLAYAN |
|            | Kalite Direktörü | Başhekim  |
|            |                  |           |