



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SİLİKON ALINMASI AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

DOKÜMAN KODU	GZ.FR.5012
YAYIN TARİHİ	01.01.2023
REVİZYON NO	0
REV. TARİHİ	-
SAYFA NO	1 / 2

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

Yöntem:

Mevcut hastalığınızın tedavisi için Sağ..... Sol..... gözünüze **SİLİKON ALINMASI CERRAHİSİ** önerilmektedir. Ameliyat lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Bu ameliyat ile, daha önce gözünüze verilmiş olan ve bir tampon madde olan silikonun geri alınması amaçlanmaktadır. Gözün en dış tabakası olan konjonktivanın açılmasını takiben, skleral giriş yerleri açılır. Takiben duruma göre gözün arkasındaki silikon önceden oluşturulan korneal ya da skleral kesi yolu ile alınır. Ancak silikon alınması sırasında ya da sonrasında retina tabakasının tekrar yerinden ayrılma riski vardır. Bu nedenle tekrar silikon verilmesi gerekli olabilir. Ayrıca özellikle şeker hastalarında ek olarak göz arkasına ilaç uygulaması gerekebilir. Ameliyat sonrası takipler sırasında ek lazer seansına ya da yeni bir ameliyata gerek duyulabilir.

Ameliyat Başarı oranı: Ameliyat süresi ortalama 20–60 dakika arasında değişebilmektedir. Nüks retina dekolmanı riski dışında başarı şansı yüksektir.

Ameliyatın Riskleri:

Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1. Göz tabakalarında yırtık ve delinme 2. Göz içine veya göz dışına kanama 3. Dokularda delinme ya da zedelenme 4. Retina dekolmanı

Ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1. Göz içi ve dışı enfeksiyon 2. Retina yırtıkları 3. Retina dekolmanı 4. Enfeksiyon 5. Göz içi basıncının yükselmesi 6. Göz içi basıncının düşmesi 7. Damar tabakasının yerinden ayrılması 8. Görme noktasında sıvı toplanması 9. Görme noktasında anormal zar gelişimi 10. Çift görme 11. Şaşılık 12. Gözün kırma kusurunda değişiklikler 13. Silikon yağının komplikasyonlarına bağlı olarak gözünüzde kalıcı görme hasarı veya gözün kaybı gelişebilir. Ameliyat sonrası gerek komplikasyonlar gerekse göz ameliyatına sebep olan hastalığınızın tekrarlaması durumunda ikinci veya daha fazla sayıda cerrahi girişim gerekebilir.

Genel riskler ve komplikasyonlar

Lokal ve genel anestezi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1. Göz ve/veya arkasındaki damarlarda retrobulber iğne ile zedelenme, 2. Anestezik madde ile görme sinirinde hasar oluşumu, 3. Anestezik ilaca karşı alerjik reaksiyon, 4. Göz arkasında kanama, 5. Genel anesteziye bağlı ya da anestezi uygulaması sırasında gerekli olan durumlarda kan ve/veya kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı sorunlar

Tedavi Olmazsanız: Size önerilen cerrahi tedaviyi kabul etmemeniz durumunda karşılaşılabilecek riskler şunlardır; 1- Katarakt 2-Glokom 3-Band keratopati 4-Bu komplikasyonlara bağlı görmede azalma



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SİLİKON ALINMASI AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

DOKÜMAN KODU	GZ.FR.5012
YAYIN TARİHİ	01.01.2023
REVİZYON NO	0
REV. TARİHİ	-
SAYFA NO	2 / 2

Onam Doğrulama :

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____