



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

LUCENTIS (RANİBİZUMAB) GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İŞLEMİ
İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

DOKÜMAN KODU	GZ.FR.5008
YAYIN TARİHİ	01.01.2023
REVİZYON NO	0
REV. TARİHİ	-
SAYFA NO	1 / 3

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

Tanı Hakkında Bilgi:

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğine gözünüzdeki rahatsızlığın tedavisi için başvurmuş bulunmaktasınız. Sağ Sol..... gözünüzetanısı konulmuş olup tedaviye gereksinim duyulmuştur.

Endikasyonlar:

- Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) 50 yaş üstü kişilerde en önemli körlük sebeplerinden biridir. YBMD'nin kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. 'Yaş' YBMD'de gözün makula denilen görme merkezinde anormal damarsal yapılar oluşur. Bu damarlardan sıvı veya kan sızıntısı olduğunda görmede azalma görülür. Tedavi edilmediği takdirde hızlı bir görme kaybı gelişebilir.
- İnatçı maküler ödem, yani makula çevresinde oluşan sıvı birikimi görmede azalmaya neden olan fakat gerekli tedaviye cevap vermeyen ödemdir. Bu, gözün ana damarlarından birinin tıkanması veya şeker hastalığı gibi durumlarda görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde görme kaybı ilerleyici ve kalıcı olabilir.

Yöntem: İşlem öncesinde göze uyuşturucu damla damlatılması sonrasında göz ve komşu alanlar gerekli steril şartları yerine getirmek için ilaçlı su ile silinecek ve yüz bölgesi tek göz açıkta kalacak şekilde steril örtü ile örtülecektir. Göz kapakları özel bir tel ile açılacak, göz yine ilaçlı su ile yıkanacaktır. İğne uygulandıktan sonra göz içine antibiyotikli damla ve pomad konulacak ve göz özel bir bandaj ile kapatılacaktır.

Alternatifler: Gözünüzdeki rahatsızlık için bu tedaviyi alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Gözünüzün tedavisi için uygulanabilecek farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Visudyne (verteporfin) ile fotodinamik tedavi, Macugen (pegaptanib), Avastin (bevasizumab), Ozurdex (deksametazon) ve uzun etkili kortizonlu ilaçlar (triamsinolon) makula ödeme ve yeni damarlanmaya neden olan farklı hastalıklar için kullanılmaktadır. Doktorunuzla size en uygun olan tedavi yöntemini ve getireceği faydalar ve riskleri tartışabilirsiniz.

Ameliyat Başarı oranı: İşlem başarı oranı hastanın yaşına, genel sistemik hastalıklarına, YBMD'nin şiddetine ve süresine göre değişkenlik göstermektedir.



**LUCENTIS (RANİBİZUMAB) GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İŞLEMİ
İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU**

DOKÜMAN KODU	GZ.FR.5008
YAYIN TARİHİ	01.01.2023
REVİZYON NO	0
REV. TARİHİ	-
SAYFA NO	2 / 3

Ameliyatın Riskleri:

Ranibizumab Enjeksiyona Bağlı Olası Komplikasyonlar:

Bu ilacın uygulandığı düşük sayıda hastada inme, kalp krizi ve damar tıkanıklığına bağlı sistemik durumlar izlenmiş bulunmaktadır. Eğer bir ilaç çok yüksek sayıda hastada kullanıldıysa, tedaviye bağlı olmayan tamamen tesadüf eseri hayati tehlikesi bulunan durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumların ilaca mı yoksa hastanın altta yatan hastalığına mı bağlı olduğu çoğu zaman netlik kazanmaz.

Genel riskler ve komplikasyonlar

Göz içi Enjeksiyonlarının Genel Riskleri:

Göz içi enjeksiyona bağlı komplikasyonlar ve yan etkiler olarak; retina tabakasında yırtık ve ayrılma, katarakt oluşumu, göz tansiyonu yükselmesi, gözün retina veya kornea tabakasında hasar oluşumu ve göz yüzeyinde veya göz içinde kanama gelişmesi sayılabilir. Bunun dışında endoftalmi denilen gözün mikrobik iltihabı görülebilir. Bu komplikasyonları siz, görmede azalma, gözde geçmeyen şiddetli ağrı ve kızarıklık olarak farkedersiniz. Bu ender görülen komplikasyonlar neticesinde ciddi görme kayıpları gelişme ihtimali vardır. Komplikasyon gelişmesi halinde durumunuz daha iyiye gitmeyebilir, hatta görmede azalma hissedebilirsiniz. Komplikasyonlar sebebiyle görme azalabilir, görme hatta göz kaybedilebilir.

Bunların engellenmesi için işlem sırasında gerekli önlemler alınır, sonrasında da size damlalar verilir. Ancak her türlü tedbire rağmen komplikasyon gelişebilir. Bu nedenle erken müdahale edilebilmesi için size söylenen zamanlarda kontrole gelmeniz gerekmektedir. Komplikasyonlar nedeniyle göz ameliyatı da dahil olmak üzere farklı tedaviler almanız gerekebilir.

Göz içi enjeksiyon yapılan hastalarda enjeksiyon öncesi hazırlıklara (göz kapağının açılması için kullanılar tel, uyuşturucu ve göz bebeğini büyütmek için kullanılan damlalar, povidon-iyot solusyonu) bağlı daha hafif yan etkiler de görülebilir. Bu yan etkiler hafif göz ağrısı, batma, sulanma, gözün kanlanması, işlem sonrası uçuşmalar görme, göz iltihabı veya görmede bulanıklık olarak sayılabilir.

Takiplerde olası komplikasyonlar için gerekli kontroller yapılacaktır ve size bilgi verilecektir.

Tedavi Olmazsanız: İlerleyici ve kalıcı görme kaybı gelişebilir.



**T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**

**LUCENTIS (RANİBİZUMAB) GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İŞLEMİ
İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU**

DOKÜMAN KODU	GZ.FR.5008
YAYIN TARİHİ	01.01.2023
REVİZYON NO	0
REV. TARİHİ	-
SAYFA NO	3 / 3

Hastaların Sorumlulukları:

Eğer sayılan yan etkiler veya komplikasyonlara bağlı olabilecek şu belirtiler oluşursa doktorumla vakit kaybetmeden temasa geçeceğim: ağrı, bulanık görme, ışığa karşı hassasiyet, gözde artan kızarıklık, çapaklanma. Gözlerimi ovalamamam ve peçete veya tülbent deđdirmemem, suyla temas ettirmemem ve reçete edilen damlayı/damlaları düzenli olarak damlatmam bana söylendi. İşlem sonrası kontroller bana söylendi ve kontrollerime bana söylenen zamanlarda gelmemin geređini ve zorunluluđunu anladım.

Onam Doğrulama:

..... (sağ) (sol) gözüme uygulanması planlanan **göz içi lucentis (Ranibizumab) enjeksiyonu işleminin** Dr..... ve/veya onun gözetimi altında çalışan asistanları tarafından gerçekleştirilmesine kendi rızamla izin veriyorum.

Aydınlatılmış onam formunun içeriđini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediđim zaman vazgeçme hakkımın olduđunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____