

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DH.LS.01
		YAYIN TARİHİ	20.06.2021
		REVİZYON NO	0
	GÜVENLİ DOĞUM SÜRECİ KONTROL LİSTESİ	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1/1

HASTA ADI SOYADI:

TARİH:

DOĞUM ÖNCESİ

1-BASVURU ANINDA		
ANNENİN SEVKİ GEREKİYORMU?		Birimleri kriterlerini kontrol edin. Serviks ≥ 4 cm iken işaretlemeye başlayınız, serviks her 1 saatte en az 1 cm genişletilmelidir. * Her 30 dk: Kalp atışı kontraksiyonlar, fetal kalp atışı *Her 2 Saat: Vücut sıcaklığı *Her 4 Saat: Kan basıncını kaydedin
EVET:		
HAYIR:		
PARTOĞRAF BAŞLATILDI MI?		
HAYIR, 4 CM VE ÜSTÜNDE BAŞLAYCAK		
EVET		
ANNE İÇİN İLAÇ KULLANIMI GEREKİYOR MU?		
ANTİBİYOTİK		Şu durumlarda anneye antibiyotik veriniz. *Vücut sıcaklığının >38 °C ise *Kötü kokulu vajinal akıntı varsa *Amniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise
EVET		
HAYIR		
MAGNEZYUM SÜLFAT		
EVET		Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz. *Diastolik kan basıncının 110 mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü *Diastolik kan basıncının 90 mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, şiddetli baş ağrısı, görüş bozukluğu,epigastrik ağrı
HAYIR		
ANTI-RETROVİRAL		
Hayır, HIV negatiflik onaylandı		*CD4 değeri350 veya daha küçük olan veya klinik tanı tedavi gerektiriyorsa verilir. *CD4 değeri 350'nin üstünde olan annelerde profilaksi amacıyla verilir.
Evet,verildi		
Durum bilinmiyor,HIV testi istendi		
Her vajinal muayenede el hijyeni ve eldiven kullanımı için yeterli malzeme mevcut		
Refakatçi doğumda bulunması için teşvik edildi		
Anne veya refakatçisinin doğumda tehlikeli bir durum karşısında yardım çağıracağı onaylandı		

2-DOĞUMDAN ÖNCE(SEZERYENDEN ÖNCE)		
ANNE İÇİN İLAÇ KULLANILMASI GEREKİYORMU?		
ANTİBİYOTİK ?	Şu durumlarda anneye antibiyotik veriniz *Vücut sıcaklığının >38 °C ise * Kötü kokulu vajinal akıntı varsa *Amniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise	
EVET VERİLDİ.		
HAYIR		
MAGNEZYUM SÜLFAT	Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz *Diastolik kan basıncının 110mmHg üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü *Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, şiddetli baş ağrısı, görüş bozuklu,epigastrik ağrı	
EVET VERİLDİ.		
HAYIR		
GEREKLİ MALZEMELERİN HASTA YATAĞINDA HAZIR OLMASI		
ELDIVEN		Bebek bakımına doğumun hemen sonrasında hazır olun. *Bebeği kurulaşın ve sıcak tutun, *Eğer nefes almıyorsa uyarın ve hava yolunu temizleyin. *Nefes almama devam ediyorsa göbek bağını kesin, ambu setiyle ventilasyona başlayın *Yardım isteyin.
SABUN		
10IU ENJEKTÖRDE OKSİTOSİN		
Gerektiği durumda doğuma yardım etmesi için asistan tanımlayıp ilgili kişi bilgilendirildi mi?		
HAYIR		
EVET		

3-DOĞUM SONRASI		
ANNEDE ANORMAL KANAMA VARMI?	Kanamanın 500ml üstü olduğu veya kanamanın 250ml üstü ve annede aneminin mevcut olduğu durumlarda: *Uterusa masaj uygulayın. *İlave uterotonikleri dikkate alın, *IV damaryolu açın,	
EVET YARDIM ÇAĞIRILDI.		
HAYIR		
ANNE İÇİN İLAÇ KULLANIMI GEREKİYORMU?		
ANTİBİYOTİK	Plasentanın manuel olarak çıkarıldığı ve vücut sıcaklığının 38 °C üzerinde olduğu, üşüme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz	
EVET VERİLDİ		
HAYIR VERİLMEDİ		
MAGNEZYUM SÜLFAT	Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz. *diastolik kan basıncının 110mmhg ve üzeri proteinürünün 3 ve üstü, *diastolik kan basıncının 90mmhg üstü ve proteinürinin 2 ve üstü şiddetli başağrısı, görüş bozukluğu, epigastrik ağrı	
EVET VERİLDİ.		
HAYIR VERİLMEDİ		
BEBEĞİN SEVKİ GEREKİYORMU	EVET PLANLANDI HAYIR	
BEBEK İÇİN İLAÇ KULLANIMI GEREKİYORMU?		
ANTİBİYOTİK	*Anneye antibiyotik uygulamasının yapıldığı *Solunumun çok hızlı (dakikada 60 üstü) veya çok düşük (dakikada 30 altında) olduğu, *Göğüste hırıltı sesinin,konvülsiyonların olduğu, *Hareket veya uyarının görülmeyeceği durumlarda, *Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstündeyse antibiyotik veriniz.	
EVET VERİLDİ		
HAYIR VERİLMEDİ		
ANTI-RETROVİRAL		
EVET VERİLDİ.	Annenin HIV + olduğu durumda antiretroviral veriniz	
HAYIR		
BEBEĞİN ÖZEL BAKIM YADA TAKİP İHTİYACI VARMI	Bebegin normal süreden 1 aydan fazla süre erken doğduğu, doğum ağırlığının 2500 gramdan az olduğu, antibiyotik kullandığı ve resüsitasyona ihtiyaç durumlarda takip ediniz.	
EVET PLANLANDI		
HAYIR PLANLANMADI		
EMZİRME VE CİLT TEMASI BAŞLADI(Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi ise		
Anne veya refakatçisinin doğumda tehlikeli bir durum karşısında yardım çağıracağı onaylandı	Annenin kanama, ciddi abdominal ağrı, şiddetli baş ağrısı, görüş bozukluğu, nefes almada güçlük, ateş,titrete veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebeğin hızlı veya zor nefes alması,ateş, normal dışı soğukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı plduğu durumlarda	
EVET		
HAYIR		

4-TABURCULUK ÖNCESİNDE		
ANNENİN KANAMASI KONTROL ALTINA ALINDI MI?	EVET HAYIR(TEDAVİ EDİN VE TABURCUYU ERTELEYİN)	
ANNE İÇİN ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKİYORMU ?		
ANTİBİYOTİK?	Vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olduğu,üşüme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.	
EVET-İLAÇ VERİN TABURCUYU ERTELEYİN		
HAYIR		
BEBEK İÇİN ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKLİ Mİ?		
ANTİBİYOTİK?	*Solunum çok hızlı (dakikada 60 üstü) veya çok düşük (dakikada 30 altında) olduğu, *Göğüste hırıltı sesinin,konvülsiyonların olduğu, *Hareket ve uyarana cevap verilmeyen durumlarda, Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstünde olduğu, *Emmeyi kestiği, *Göbek bağının çevresinin cilde doğru kızmızlaşması durumlarında bebeğe antibiyotik veriniz.	
EVET:ANTİBİYOTİK VERİN TABURCUYU ERTELEYİN ÖZEL BAKIM SAĞLAYIN.		
HAYIR:		
BEBEK İYİ BESLENİYOR MU?	EVET HAYIR(YARDIM EDİN TABURCUYU ERTELEYİN)	
ANNEYE AİLE PLANLAMA SEÇENEKLERİ SUNULMASI GEREKİYOR MU?	EVET BİLGİLENDİRME YAPILDI HAYIR	
DOĞUM SONRASI İÇİN TAKİP AYARLANMASI GEREKİYORMU	EVET BİLGİLENDİRME YAPILDI HAYIR	
ANNE VEYA REFAKATÇISI YARDIM ÇAĞIRMASI GEREKTİĞİ DURUMLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ Mİ?	EVET PLANLAMA YAPILDI HAYIR	Annenin kanama,ciddi abdominal ağrı,şiddetli baş ağrısı,görüş bozukluğu,nefes almada güçlük,ateş,titrete veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebeğin hızlı veya zor nefes alması,ateş,normal dışı soğukluk,beslenmeyi kesmesi,hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı olduğu durumlarda.