

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	İY.LS.15
		YAYIN TARİHİ	21.09.2023
		REVİZYON TARİHİ	--
	GEBELİKTE VE EMZİRMEDE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR LİSTESİ	REVİZYON NO	0
		SAYFA NO	1/1

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI : FDA ilaçların olası teratojenik etkilerinin ciddiyetine göre ilaçları A, B, C, D ve X olmak üzere 5 kategori içerisinde toplamıştır.

D kategorisi: Bu kategorideki ilacın insanda fetüs üzerine zararlı etkisi kanıtlanmıştır. D kategorisindeki ilaç, ilacın kullanılmaması durumunda anne aday ve fetüs daha büyük risklerle karşılaşılacaksa, yarar-zarar oranı dikkate alınarak, yaratabileceği olası riskler anne adayına detaylarıyla anlatılarak, kullanılmalıdır.

X kategorisi: Bu kategorideki ilaçların deney hayvanları ve hamilelerdeki incelemeler ilacın fetusa zararını göstermiştir. Üstelik, bu gruptaki ilaçların hamilelerde kullanılmalarının yararları fetusa zararlarının yanında önemsiz kalır. X kategorisindeki ilaçlar, hamilelerde ve hamile kalma olasılığı bulunanlarda kontrendikedirler ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

X KATEGORİSİ İLAÇLAR		
ALPROSTADİL	DAKARBAZİN	TİYOKOLŞİKOSİT
ASİTREİN	TOLVAPTAN	METHOTREXAT
ATORVASTATİN	WARFARİN	ÖSTROJENLER
MİZOPROSTOL	TALİDOMİT	RİBAVİRİN
DUTASTERİT	ROSUVASTATİN	METİLEN MAVİSİ
GOSERELİN ASETAT	OKSİTOSİN	İLOPROST
LEFLUNOMİD	MEGESTEROL ASETAT	VİTAMİN A

D KATEGORİSİ İLAÇLAR		
BENZODİAZEPİNLER	ARB ler	TİGESİKLİN
AMİKASİN	MİKOFENOLAT	FLUKONAZOL
GENTAMİSİN	LİTYUM	VORİKONAZOL
STREPTOMİSİN	PAROKSETİN	ZOLEDRONİK ASİT
AMİODARON	VALPROİK ASİT	KARBAMAZEPİN
ATENOLOL	TOPİRAMAT	FENİTOİN
NSAI	TETRASİKLİN	FENOBARBİTAL
ACE INH	DOKSİSİKLİN	PROPİLTİYOURASİL
ASETİL SALİSİLİK ASİT	HYDROXYUREA	ANTİNEOPLASTİKLER
LEVOSİMENDAN		

Emzirme döneminde ilaç kullanımında anne sütü aracılığı ile bebekte istenmeyen etkilere neden olabilir.

EMZİREN ANNELERDE KONTRENDİKE İLAÇLAR		
METHOTREXAT	LİTYUM	DOKSORUBİSİN
AMİODARON	AMFETAMİNLER	ERGOTAMİN
İZOTRETİONİN	BROMOKRİPTİN	
SİKLOSPORİN	SİKLOFOSFAMİD	