



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

İLAÇ UYGULAMALARINDA KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR LİSTESİ

DOKÜMAN NO	İY.LS.06
YAYIN TARİHİ	21.09.2023
REVİZYON TARİHİ	--
REVİZYON NO	0
SAYFA NO	1/1

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR	ANLAMLARI	OLUŞABİLECEK HATALAR	DOĞRU KULLANIM
ASA	Asetil Salisilik Asit	Anestezi değerlendirme testi ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
KCL	Potasyum Klorür Ampul	HCL ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
MS,MSO4	Morfin Sülfat	Magnezyum sülfat ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
MgSO4	Magnezyum Sülfat	Morfin sülfat ile karışabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
s.g	Suda Glikoz	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
s.s	Serum Sale	Yüksek risk grubundaki ilaçtır	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
IU	Uluslar arası Ünite	IV (İntra venöz) ya da 10 ile karışabilir	Uluslar arası ünite yazılmalıdır
U	Ünite	0 veya 4 rakamları ile karışabilir	Ünite Kullanılmalıdır
µg	Mikrogram	mg ile karışabilir	mcg kullanılmalıdır
D5	%5 Dekstroz	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir	İlacın ismi tam olarak yazılmalı
1.0mg	1 mg	10 mg olarak algılanabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalı
.5mg	0.5 mg	Nokta görülmediğinde 5 mg olarak anlaşılabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalı
cc	Cubic centimeter	Sıfır rakamı ile karışma riski var	ml kullanılmalıdır
SC	Subkütan	Yazım sırasında SL ile karışma riski bulunuyor	subkütan yada cilt altı yazılmalı