

	T.C. NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	GN.FR.2663
		YAYIN TARİHİ	06.10.2017
	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AMNİYOSENTEZ ONAM FORMU	REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

Yöntem: 15-20. gebelik haftaları arasında anne karnından işleme özel bir iğne ile girilerek, ultrason görüntülemesi yardımıyla bebeğin içinde bulunduğu keseden 20 cc sıvı (amniyon sıvısı) alınıp, örneklenmesinin yapılmasıdır.

Alternatifler: Bu işlemin herhangi bir alternatifi olmamakla birlikte, hasta işlemi kabul etmezse antenatal takip önerilir.

İşlemin Başarı oranı: İşlemin %99 başarı oranı vardır.

Genel riskler ve komplikasyonlar : %0.5-1 ihtimal ile işleme bağlı olarak düşük, kanama, su gelmesi EMR (erken membran rüptürü), nadir olarak enfeksiyon, geçici kramp ve kasılma gibi durumlar gerçekleşebilir.

İşlemin tahmini süresi: İşlem ortalama 5 dakika sürmektedir.

Tedavi Olmazsanız: Bu işlem tedavi amaçlı bir işlem değil, tanı amaçlı bir işlemdir. Bebeğe genetiksel bir sıkıntının veya enfeksiyon hastalıklarının varlığının tespiti için bu işlemin yapılması önerilir. İşlemin kabul edilmediği durumlarda antenatal takip önerilir.

Özel Durumlar: Gebede ağrı, kanama gibi durumlar mevcut ise işlemin yapılması uygun değildir. Ayrıca gebenin DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin), aspirin, antikoagülan gibi ilaçlar kullanıp kullanmadığı sorulur, kullanılmış ise işlem ertelenir. Ayrıca gebenin kan grubu sorgulanıp RH uyumsuzluğu olan gebelere işlemden sonra Anti-D immunglobulin (kan uyumsuzluk iğnesi) yapılır. İşlemden sonra gebeler ilk 2-3 gün istirahat etmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdırlar.

	Adı-Soyadı	Tarih-Saat	İmza
Hasta / HastaYakını			
Doktor/Hemşire			
Tanıklıkeden			

Notlar:

1. Hasta 18 yaşından küçük, bilincikapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değilse ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir.