

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI YENİDOĞAN DİYABET GLİBEN SUR HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU	DOKÜMAN KODU	GN. FR.2200
		YAYIN TARİHİ	20.05.2015
		REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	10.06.2015
		SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

Hastaya konulan tanı: Doğumsal diyabetes mellitus, Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY)

Önerilen tedavi yöntemi: Doğumsal diyabetes mellitus’de insülin ya da genetik problemin tespiti ile günde 2 defa (5 mg/doz) glibenclamide kullanımı gerekebilir. Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) klinik tiplerine göre sülfanilüreler, metformin kullanılabilir ya da insülin gerekebilir. Düşük doz insülin kullanımı çoğu zaman yeterlidir.

Önerilen tedavinin süresi: Kan şekeri yüksekliği devam ettiği sürece

Verilecek ilaçların kullanım şekli ve olası yan etkileri:Glibenclamide gastrointestinal yan etkiler ve kemik iliği baskılanması oluşturabilir. Kalp üzerine toksik etkileri olabilir. Karaciğer enzimlerini yükseltebilir. Hipoglisemi oluşturabilir. Metformin en sık gastrointestinal sisteme ait yan etkiler ortaya çıkar. Ağızda metalik tad, karın ağrısı, bulantı, ishal ve iştahsızlık, laktik asidoz görülebilir. İnsülin cilt altına insülin enjektörü veya insülin kalemi olarak adlandırılan araçlar ile, kola, bacağı ve karın bölgesine yapılır. Enjeksiyon yeri her defasında değiştirilmeli ve ovulmamalıdır. Tedavi sonrası bölgesel alerjik reaksiyonlar ve enflamasyon görülebilir. Doz kişinin bireysel ihtiyacına göre ayarlanmadığında veya konunun uzmanı olan pediatrik endokrinolog ve hemşiresinden eğitim almadan uygulandığında hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği), şişmanlık, hipoglisemi ve hiperglisemi koması gelişebilir Tüm ilaçların öngörülen yan etkileri dışında öngörülme (önceden bilinmeyen-alışılmışın dışında kalan) etkisi olabilir. Tüm ilaçlar alerjiye neden olabilir fakat ciddi alerjik reaksiyonlarda ölüm riski olabilir.

Alternatif tedavi yöntemleri, avantaj ve dezavantajları: Doğumsal diyabetes mellitusda da insülin kullanılabilir ancak yenidoğanda hastanın yaşının küçük olması nedeni ile kan şekeri düzenlenmesi zor ve hipoglisemi riski daha fazladır.

Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi halinde hastalığın yaratacağı sorunlar:Tedavide önerilen ilaçların kullanılmaması durumunda gelişen kan şekeri yüksekliği komaya neden olabilir, böbrek, göz, damar ve sinir sisteminin bozabilir.

Hasta sahibine tarafımdan ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Dr.....İmza:

Tarih:.....

Saat:.....

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen hastama yapılacak tedavi konusunda doktor tarafından bana ayrıntılı bilgi verildi. Yukarıdaki belgeyi okudum ve anladım. Çocuğuma yapılacak tedaviyi, sağlığı açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin farkında ve bilincinde olarak kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum.

Hastanın veli / vasi (si):

Adı Soyadı:İmza:

Adres:.....

Tarih:.....

Saat:.....

Şahit: Hekim tarafından hasta sahibine ayrıntılı bilgi verildiğini onaylarım.

Adı Soyadı:İmza:

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR