

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1343
		YAYIN TARİHİ	00.00.0000
	KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1/2

PAROTİDEKTOMİ AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat

Yöntem: Bu ameliyat genellikle genel anestezi (narkoz) altında yapılır.

Parotidektomi, kulağın ön-altında yerleşmiş en büyük tükürük bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Hastalığın cinsi, büyüklüğü yada yerleşim yerine göre tükürük bezinin bir kısmı yada tamamı çıkarılabilir. Sıklıkla hastalıklı tükürük bezi miktarına ve yerleşimine göre tükürük bezinin bir miktarı çıkarılır. Bu bezin, bir kısmının yada tamamının çıkarılmasının en sık nedeni, bezin içinde kitle varlığıdır, daha nadiren de bezin müzmin iltihabı veya tükürük akımının tıkanmasıdır. Cerrahinin boyutu ameliyat sırasında çıkarılan dokunun incelenmesi ile değişebilir.

Alternatifler: Cerrahi öncesinde kötü huylu tümör teşhisi varsa yada ameliyat sırasında bu durum tespit edilirse tükürük bezinin çıkarılması dışında ek tedavi yöntemleri de gerekebilir. Bunlar aynı seansta boyun diseksiyonu (boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi) ve radyoterapidir (ışın tedavisi).

Ameliyat Başarı oranı: Ameliyatın başarı oranı tümörün yerine, cinsine, boyuna yayılım miktarına, evresine, hastanın genel durumuna ve isteğine vb. birçok faktöre göre değişir.

Ameliyatın Riskleri: Yüz hareketlerini kontrol eden ve mimik hareketleri sağlayan sinir (fasiyal sinir) bu tükürük bezi içinden geçer. Tükürük bezi çıkarılırken çok sıklıkla bu sinirde kalıcı bir hasar oluşmamakla birlikte hastalığın cinsi, boyutu yada yerleşim yeri nedeniyle bu sinirin bazı küçük dalları, ana dalları yada tamamının kesilmesi/feda edilmesi gerekebilir. Kalıcı hasar oluşmamış olsa bile yüz hareketlerinde sinir fonksiyonları yerine gelinceye kadar bir azalma olabilir. Eğer yüz hareketleri tamamen düzelmezse çeşitli yöntemlerle bu sorun giderilmeye çalışılır.

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

• **Sık görülebilen yan etkiler:**

1. Ameliyat bölgesinden kanama
2. Yara yerinde kan toplanması (hematom)
3. Kulak memesinde uyuşukluk

• **Nadir görülebilen yan etkiler:**

1. Geçici kısmi yüz felci (tüm yüz yada yüzün bazı bölümleri olabilir)
2. Yara enfeksiyonu ve buna bağlı damardan uzun süre antibiyotik alımı

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1343
		YAYIN TARİHİ	00.00.0000
	KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	2/2

3. Cilt kesisinin kötü iyileşmesi (keloid, skar)

• **Çok nadir görülebilen yan etkiler:**

1. Ameliyat bölgesinden cilde tükürük kaçağı
2. Yemek yerken ameliyat bölgesinin cildinde terleme
3. Kalıcı yüz felci (tüm yüz yada yüzün bazı bölümleri olabilir)
4. Operasyon esnasında nefes alabilmek için boyunda geçici bir delik açılması(trakeotomi),
5. Operasyon esnasında gerekli görüldüğü takdirde tümöre bağlı oluşan lenf bezlerinin temizlenmesi için ameliyat sahası boyna kadar genişletilip ve hatta nadiren de olsa kitlenin tamamının çıkarılması için alt çene kemiğinin kesilebilmesi (mandibulotomi).

Genel riskler ve komplikasyonlar: Narkoz sırasında ek olarak kanamayı önleyici bir ilacın yapılması ile ender olarak beklenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Bunlar:

- Alerjik reaksiyonlar; şişlik, kaşıntı, hatta şoka varabilen ağır dolaşım bozuklukları,
- Merkezi sinir sistemine ait yan etkiler; huzursuzluk, kasılmalar, solunum bozuklukları,
- Kan basıncı yükselmesi veya düşmesi, kalp ritm bozuklukları ve kalp atışının yavaşlaması.

Ayrıca genellikle gerekmemesine rağmen, olağanüstü bir durumda lüzumu halinde kullanılabilecek kan veya kan ürünlerinin nakli sırasında oluşabilecek hastalık bulaşma ihtimali de vardır

Tedavi Olmazsanız: Tükürük bezindeki kitlenin büyümesi/büyümeye devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Kitlenin özelliği malign (kötü huylu) ise büyümesinden öte boyuna, akciğer, karaciğer, beyin gibi hayati organlara da sıçraması söz konusudur. Hastalığın yayılması dışında kötü huylu kitlelerde deriden çıkıp kötü bir görünüme neden olması, yüz felci yapabilmesi de bu hastalığın seyrinde görülebilir.

Onam Doğrulama: Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.