



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN. FR.2195
	YAYIN TARİHİ	20.05.2015
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI BÜYÜME HORMON EKSİKLİĞİ HASTA ONAM FORMU	REVİZYON NO	01
	REVİZYON TARİHİ	06.10.2015
	SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

Hastaya konulan tanı: Büyüme Hormon Eksikliği

Önerilen tedavi yöntemi: Büyüme Hormonu.

Önerilen tedavinin süresi: Yıllık büyüme hızı 5 cm altına inene veya kemik yaşı 14-15 olana kadar, tedavi ile boy kızlarda 155 cm erkeklerde 165 cm 'e ulaşana kadar kullanılır. Büyüme tamamlanmış ise ilaç kesildikten yaklaşık 3-6 ay sonra testler gerekirse tekrar yapıp kalıcı büyüme hormon eksikliği var ise erişkin dozda tedaviye devam edilebilir.

Verilecek ilaçların kullanım şekli ve olası yan etkileri:

Dozaj 25-100mcg/kg/gün olup bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzey alanına bağlıdır. Haftalık dozlar; yediye bölünerek cilt altı enjeksiyonu şeklinde (günde bir kez) uygulanır. Klinik çalışma verilerine göre kısa boylu çocuklarda yaklaşık %10, yetişkinlerde ise %30-40 civarında yan etkiye rastlanabilmektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişlik, apse gibi geçici cilt reaksiyonlarına rastlanabilmektedir. Bu belirtiler tedavinin başlangıcını takiben ortaya çıkabilmekte ve zaman içinde sıklığı azalmaktadır ve günlük aktiviteleri nadiren etkilemektedir. Büyüme hormonu kullanımı sırasında yüz ve uzuvlarda büyüme olabilir. Büyüme hormonu kullanımı sırasında hastalarda geçici tiroid yetmezliği gelişebilir. Bu açıdan laboratuvar testleri tedavi sırasında izlemde yapılacaktır. Büyüme hormonu eksikliği olan bazı vakalarda, büyüme hormonu ile tedavi edilmiş olsun veya olmasın, büyüme hormonu yetersizliği olmayan çocuklara kıyasla biraz yüksek sıklıkta kan kanseri tespit edilmiştir. Bunun büyüme hormonu tedavisi ile ilgisi tespit edilememiştir. Nadir kafa içi basınç artışı olan vakalar bildirilmiştir. Kemikte büyüme plaklarında kayma olabilir. Topallama ve bacaklarda ağrı şikayeti olursa bu durum değerlendirilir. İlacın öngörülen yan etkileri dışında öngörülmeyen (önceden bilinmeyen-alışılmıyşın dışında kalan) etkisi olabilir. Tüm ilaçlar alerjiye neden olabilir ve ciddi alerjik reaksiyonlarda ölüm riski olabilir. Büyüme hormonu değerleri düşük olsa bile nadiren, tedavi ile büyüme hızında artış olmaz, bu takdirde tedavi kesilebilir.

Alternatif tedavi yöntemleri, avantaj ve dezavantajları: Yok

Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi halinde hastalığın yaratacağı sorunlar: Kısa erişkin boy, metabolik problemler.

Hasta sahibine tarafımdan ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Dr.....**İmza:**

Tarih:..... **Saat:**.....

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen hastama yapılacak tedavi konusunda doktor tarafından bana ayrıntılı bilgi verildi. Yukarıdaki belgeyi okudum ve anladım. Çocuğuma yapılacak tedaviyi, sağlığı açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin farkında ve bilincinde olarak kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum.

Hastanın veli / vasi (si):

Adı Soyadı: **İmza:**

Adres:.....

Tarih:..... **Saat:**.....

Şahit: Hekim tarafından hasta sahibine ayrıntılı bilgi verildiğini onaylarım

Adı Soyadı: **İmza:**