



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN. FR.2199
	YAYIN TARİHİ	20.05.2015
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI DİYABETES İNSİPIDUS HASTA ONAM FORMU	REVİZYON NO	01
	REVİZYON TARİHİ	06.10.2015
	SAYFA NO	Sayfa 1 / 1

### Hastaya konulan tanı: DİYABETES İNSİPIDUS

Çok su içme-idrara çıkma yakınmalarıyla tanınan ve tanısı susuzluğa vücudun verdiği yanıtın değerlendirildiği susuzluk testi ile konan bir hastalıktır. Diyabetes insipidusa ADH adlı hormonun eksikliği neden olmaktadır. Bu hormonun eksikliğinde vücut gerekli olduğu halde suyu böbreklerden geri ememekte ve su idrarla kaybedilmektedir. İdrarla kaybedilen su yerine su içmekle konmaz ise vücut susuz kalmakta ve dehidratasyon olarak tanımlanan, birçok organın etkilenebileceği şok, koma ile sonuçlanabilen tabloya neden olabilmektedir.

**Önerilen tedavi yöntemi:** Çocuğunuza eksik olan hormonun yerine konması amacıyla desmopressin etken maddeli ilaç başlanacaktır.

**Önerilen tedavinin süresi:** Bu ilaç hormon eksikliği kalıcı olduğu için ömür boyu kullanılacaktır.

**Verilecek ilaçların kullanım şekli ve olası yan etkileri:** İlaç sprey, tablet şeklinde uygulanacak, gerekli olan hallerde ise damar yolu veya deri altından uygulanacaktır. Sürekli kullanım için sprey şeklinde burundan uygulanması etkinlik ve uygulanma kolaylığı açısından daha fazla tercih edilmektedir. Fakat gribal enfeksiyonlarda burun mukozasından ilaç emilimi azalabileceği için ilacın kullanımı ve dozu doktoru ile görüşülmelidir. İzlemede çocuğunuzun içtiği su miktarı, günlük idrar sayısı ve miktarı ve yapılacak olan kan ve idrar tetkikleriyle ilaç dozu ayarlanacaktır. Desmopressin diyabetes insipidusta önerilen şekilde ve düzgün kullanıldığında etkin bir ilaçtır. Desmopressin bağlı yan etkiler olarak burunda irritasyon, baş ağrısı, bulantı, kusmaya neden olabilir. Dozun fazlalığı ve/veya aşırı sıvı alınması vucutta aşırı su tutulması ile karakterize havale geçirme ve komaya neden olabilen “su zehirlenmesi” tablosuna neden olabilir. İlacın öngörülen yan etkileri dışında öngörülmeyen (önceden bilinmeyen-alışılmışın dışında kalan) etkisi olabilir. Tüm ilaçlar alerjiye neden olabilir ve ciddi alerjik reaksiyonlarda ölüm riski olabilir.

**Alternatif tedavi yöntemleri, avantaj ve dezavantajları:** Diyabetes insipidusun desmopressin tedavisi dışında başka bir tedavi şekli yoktur.

**Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi halinde hastalığın yaratacağı sorunlar:** Bu ilacın kullanılmaması halinde çocuğunuz fazla miktarda idrar yapacak, kaybettiği sıvıya bağlı olarak, yukarıda belirtilen dehidratasyon tablosu oluşacak, komaya kadar giden olumsuzluklar yaşanabilecektir.

Hasta sahibine tarafımdan ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Dr.....İmza:

Tarih:..... Saat:.....

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında takip edilen hastama yapılacak tedavi konusunda doktor tarafından bana ayrıntılı bilgi verildi. Yukarıdaki belgeyi okudum ve anladım. Çocuğuma yapılacak tedaviyi, sağlığı açısından oluşabilecek tüm olumsuz etkiler ve risklerin farkında ve bilincinde olarak kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kabul ediyorum.

**Hastanın veli / vasi (si):**

Adı Soyadı: ..... İmza:

Adres:.....

Tarih:..... Saat:.....

**Şahit:** Hekim tarafından hasta sahibine ayrıntılı bilgi verildiğini onaylarım.

Adı Soyadı: ..... İmza: