



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.2022
	YAYIN TARİHİ	13.02.2014
İMMUNOLOJİ ve ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI	REVİZYON NO	00
	REVİZYON TARİHİ	--
	SAYFA NO	1 / 2

DERİ BİYOPSİSİ (PUNCH BİYOPSİ) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat
.....

Yöntem: Mikroskop altında incelenmek üzere cildinizden küçük bir parçanın kısa ve basit bir işlem ile alınmasına “deri biyopsisi” denir. Biyopsi alınacak deri bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra, silindirik biçiminde bir kesiciden ibaret olan biyopsi aleti bu alanın üzerine konulur. Hafifçe bastırılır ve çevrilir. Dairesel olarak kesilmiş olan deri parçası bistüri adı verilen cerrahi bıçak ile yerinden ayrılır. Kanamayı durdurmak için bölgeye tampon ile 3-5 dakika baskı yapılır, kanama kontrolü sağlandıktan sonra, deri parçasının alındığı alan ortalama 2-3 adet cerrahi dikiş ile kapatılır. Son olarak biyopsi alınan bölge steril bir şekilde gazlı bez ve flaster ile kapatılır. Bu işlem yaklaşık olarak 30 dakika içinde tamamlanır. Biyopsi işleminin yapıldığı gün evinize gidebilirsiniz.

Alternatifler: Biyopsi işleminin alternatifi mevcut değildir.

İşlemin Başarı oranı: Alınan dokunun yeterlilik olmaması ve patolojik inceleme hazırlık ve yöntemlerine bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak ön tanıyı doğrulama veya dışlama açısından yeterli bilgi sağlamaktadır.

İşlemin riskleri: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, nadire de olsa, biyopsi alanının enfekte olma ihtimali vardır. Bu nedenle biyopsi yerinde ağrı, çevresinde kızarıklık vb. şikayetler ortaya çıkarsa yaranın kontrolü ve pansuman için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Biyopsi alanında küçük bir iyileşme dokusu (nedbe) oluşacaktır. Bazı kişilerde bu iyileşme dokusu aşırı miktarda olabilir. Daha önceden cildiniz ile ilgili böyle bir gözleminiz varsa (örnek: kesiklerin aşırı iz bırakarak iyileşmesi gibi), biyopsi işleminden önce doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Genel riskler ve komplikasyonlar: Yukarıdaki maddede izah edilen riskler nadir olarak gözlenir.

İşlemi kabul etmez iseniz: Doğru tanı koyma şansı kullanılmamış olur.

Özel Durumlar: İşleminiz tamamlandıktan sonra evinize gidebilirsiniz. Biyopsi alanında bir ya da iki gün az miktarda rahatsızlık hissi (ağrı ya da acı) duyabilirsiniz. Doktorunuz size aksini önermediyse ağrı kesici bir ilaç (parasetamol) alabilirsiniz. Biyopsi alanı üzerine uygulanmış olan gazlı bez ve flaster en az 5 gün muhafaza edilmelidir. Normalde dikişler “Kalite Yönetim Sistemi” klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.2022
	YAYIN TARİHİ	13.02.2014
	REVİZYON NO	00
	REVİZYON TARİHİ	--
	SAYFA NO	2 / 2
İMMUNOLOJİ ve ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI		

alınıncaya kadar (7 .nci gün) tekrar pansumana gerek yoktur. Ancak biyopsi yerinde ağrı, çevresinde kızarıklık vbşikayetler ortaya çıkarsa yaranın kontrolü ve pansuman için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve/veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____