



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

İNTANIYE ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1373
YAYIN TARİHİ	06.08.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1/2

KARACİĞER BİYOPSİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

.....

.....

.....

Karaciğer biyopsisi ne amaçla yapılır?

Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin karaciğere yaptığı hasarın derecesini değerlendirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. Ayrıca hastaya uygulanan çeşitli tedavilerin etkinliğinin takibinde de yararlıdır. Sadece sarılıkların tanısında değil diğer birçok karaciğer hastalığının tanısında oldukça değerli bir metottur.

Biyopsi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar:

Biyopsi öncesi son bir hafta içerisinde aspirin, ibuprofen, naproksen, warfarin gibi ilaçlar alınmamalıdır. Lokal anestezi ilaçlara ve diğer bilinen ilaçlara alerji olup olmadığı hekime bildirilmelidir. Kanama bozukluğu olan hastalarda (hemofili ve benzeri) biyopsi yapmak sakıncalıdır. Bu tür hastalığı olanlar hekime bildirmelidir.

Biyopsi öncesi hazırlıklar:

Biyopsi öncesi kanama ile ilgili ciddi komplikasyon çıkmaması için yakın zamanda KC ultrasonografisi yapılır. Ayrıca tam kan testi içinde trombosit sayısı ve diğer kan hücreleri gözden geçirilir. Biyopsi öncesi klinikteki asistan doktor kanama ve pıhtılaşma testlerini yapar. Hematoloji laboratuardan kanama ile ilgili PT ve PTT testleri kontrol edilir.

Biyopsi nasıl yapılır?

Deri antiseptik ile temizlenir. İğnenin gireceği alana lokal anestezi ilaç enjekte edilir. Daha sonra ince ağızlı bistüri ile biyopsi iğnesinin kolay girebilmesi için kaburga arasına birkaç mm rehber delik açılır. Karın derisi üzerinden karaciğere kendi özel iğnesi ile girilerek bir parça karaciğer dokusu alınır. Biyopsi iğnesinin karaciğere girişi sırasında hafif ağrı hissedebilirsiniz. Karaciğerden alınan örnek tetkik için patolojiye gönderilir.

Biyopsi sonrasında dikkat edilecek hususlar

Biyopsiden sonra hastaların 24 saat hastanede gözlenmesinde yarar vardır. Hastalar 2-3 gün istirahat etmeli, bir hafta süresince 5-7 kg'dan fazla ağırlık kaldırmamalı, yine bu süre içerisinde kanı sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır.

Karaciğer biyopsisi yapılması sırasında ve sonrasında görülen istenmeyen durumlar nelerdir?

* Sık görülmeyen durumlar

İğnenin giriş yerinde kanama veya karın içi boşluğa kanama olması

Çok nadiren, iğne, girdiği alana yakın dokulara hasar verebilir. (Örneğin; safra kesesi, ince barsaklar, böbrek)



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

İNTANIYE ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1373
YAYIN TARİHİ	06.08.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	2/2

*** Daha sık görülen durumlar**

Biyopsi yapılan yerde ağrı: Genellikle 24 saat sürer. Gerekirse ağrı kesici alınabilir.

Bayılma , değişik derecelerde allerjik reaksiyon.

*** Önemli, fakat sık görülmeyen durumlar**

İnfeksiyon gelişmesi, akciğer zarı delinmesi.

Hava embolisi: Karaciğerden kan damarları içine hava kabarcıklarının girmesiyle oluşur.

Safra kesesinin yırtılması ve safranın batına yayılması

Ölüm (1/1000- 1/10.000)

Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim