



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1392
	YAYIN TARİHİ	06.08.2013
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00
	REVİZYON TARİHİ	--
	SAYFA NO	1/3

SKLEROTERAPİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı

.....

Dosya No

.....

Tarih / Saat

.....

Yöntem:

Skleroterapi bacaklardaki ağ görünümlü ve genişlemiş toplardamarların tedavisinde sıkça kullanılan bir tedavi şeklidir. Varisler, bacaklarda belirginleşen, mavi renkli ve 1-2 mm çapında ciltten kabarıkan damarlar olarak gözükürler. Toplardamarların genişlemesinden oluşan mavi renkli ağ damarlar ise genellikle 2-4 mm kalınlığında olup uyluk bölgesinde daha sık göze çarparlar. Telenjektaziler 1 mm'den küçük, düz ve kırmızı renkte kan damarlarıdır. Tüm bu küçük damarsal lezyonların tedavisinde etkili olmasına rağmen, skleroterapinin daha büyük çaplı damarların genişlemelerinde yeri yoktur.

Skleroterapi bacaklarda gelişen variköz venler için kozmetik sebeplerle yapılabileceği gibi, ağrı veya ven iltihabını önlemek için koruyucu amaç için de yapılabilir. Tromboflebit (bacakta toplardamar iltihabı), akciğer embolisi ve kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda yapılması tercih edilmez.

Skleroterapi, bacaklarda genişlemiş olan damarların içerisine tıkaçıcı madde verilmesi işlemidir. Genellikle tek seans yeterli olmamaktadır ve 4-8 haftalık aralıklarla tekrarlayan uygulamalar gerekmektedir. Skleroterapi işlemi öncesinde anestezi uygulanmasını gerektirmemektedir ve genellikle ağrısızdır. Poliklinik odalarında 1 saatten kısa bir süre içerisinde çok ince iğneler ile genişleyen damarlar içerisine tıkaçıcı madde verilebilmektedir. Kullanılan tıkaçıcı maddeler çeşitlidir ve her birinin kendine özgü risk ve komplikasyonları bulunabilir. Skleroterapi sonrası hastanın yürümesine izin verilir.

Alternatifler:

Skleroterapi çoğunlukla kozmetik nedenler ile yapılan bir girişimdir. Ağrı görünümdeki damarlar ağrıya neden olabilirlerken, telenjektaziler ağrı yapmazlar. Bu nedenle ağrı şikâyeti ön planda olan hastalarda ek tetkiklerin yapılması önerilmektedir. Skleroterapiye alternatif olarak bu genişlemiş damarların cerrahi ile çıkartılması yada lazer ile tedavi edilmesi söz konusudur. Fakat tüm alternatif tedavi şekilleri de, kendilerine göre ayrı risk ve komplikasyon ihtimali taşımaktadırlar.

Ameliyatın Riskleri:

Genel riskler ve komplikasyonlar

Her müdahale belirli oranda risk taşır ve önemli olan sizin skleroterapi ile ilgili olan riskleri anlamanızdır. Bireyin uygulanacak olan girişimi seçimi, olası yarar ve risklerin karşılaştırılmasına bağlıdır. Her ne kadar hastalarda komplikasyonların çoğuyla karşılaşılmasa da, olası komplikasyonların her birini, girişimin risklerini ve sonuçlarını anladığınıza emin olmanız için mutlaka cerrahinizle tartışmalısınız.

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1392
YAYIN TARİHİ	06.08.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	2/3

Cilt nekrozu: Skleroterapi işlemi sonrasında ciltte dökülme ve nekrozlar görülebilir. Nadir görülen bu komplikasyon, özellikle tıkaçıcı maddenin damar dışına kaçması sonrasında daha olasıdır.

Tromboflebit: Damarlarda pıhtı oluşması ile birlikte görülen damar yangısıdır. Tromboflebit gelişmesi durumunda antibiyotik veya bir ameliyatın tedaviye eklenmesi zorunlu olabilir.

Selülit: Skleroterapi sonrası enfeksiyon sık görülmez. Enfeksiyon varlığında antibiyotik veya bir ameliyatın tedaviye eklenmesi zorunlu olabilir.

Allerjik reaksiyonlar: Nadir olgularda tıkaçıcı ilaca ve sargılara karşı allerji geliştiği bildirilmiştir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilirler.

Tatmin edici olmayan sonuçlar: Skleroterapi sonrasında memnuniyet vermeyen sonuçların olma olasılığı vardır. Skleroterapi uygulanan alanlarda ciltte renk değişiklikleri, ele gelen kabarıklıklar yada telenjenzik damar düğümleri oluşabilir. Bu tip sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Tekrarlayan seansların gerekliliği: Skleroterapi genellikle tek seansta sonlanan bir işlem değildir ve aralıklı olarak tekrarlayan uygulamaları gerektirir. Komplikasyon oluşursa ek tedaviler zorunlu hale gelebilir. Her ne kadar risk ve komplikasyonlar çok sık olmasa da, skleroterapi işleminde de hatırdaki tutulmalıdır. Her ne kadar sonuçlar iyi beklense de, garanti verilemez ya da sonucun kesinliğine güvenilemez.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1392
YAYIN TARİHİ	06.08.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	3/3

Özel Durumlar:

Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.